

2024

MATHEMATICS — MINOR

Paper : MN-2

(Basic Algebra)

Full Marks : 75

Candidates are required to give their answers in their own words
as far as practicable.

প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।

সমগ্র প্রশ্নপত্রে \mathbb{R} বাস্তব সংখ্যার সেট-কে নির্দেশ করে।

সমস্ত চিহ্নের স্বাভাবিক অর্থ ধরে নিতে হবে।

বিভাগ - ক

(মান : ২৫)

১। যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

২½×২

(ক) -1 -এর ঘনমূল নির্ণয় করো।(খ) ডেকার্টের নিয়মের সাহায্যে $x^8 - 1 = 0$ সমীকরণের বীজগুলির প্রকৃতি নির্ণয় করো।(গ) দেখাও যে, $(n+1)^n > 2^n \cdot n!$ যেখানে n কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা।(ঘ) যদি $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ সমীকরণের বীজগুলি সমান্তর প্রগতিতে থাকে, তবে দেখাও যে $p^2 \geq 3q$.

২। যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৫×৪

(ক) যদি a, b যে-কোনো দুটি বাস্তব সংখ্যা (উভয়েই শূন্য নয়) হয়, তবে দেখাও যে $\sin \left[i \log \frac{a-ib}{a+ib} \right] = \frac{2ab}{a^2 + b^2}$.(খ) কার্ডানের পদ্ধতি দ্বারা $x^3 - 18x - 35 = 0$ সমীকরণটি সমাধান করো।(গ) $2x^3 - x^2 - 18x + 9 = 0$ সমীকরণের দুটি বীজের পরমমান সমান এবং বিপরীত চিহ্নযুক্ত হলে সমীকরণটি সমাধান করো।(ঘ) Cauchy-Schwartz অসমতা ব্যবহার করে প্রমাণ করো যে $(a+b+c+d) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \right) > 16$, যেখানে a, b, c, d সবই ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা (সবাই সমান নয়)।(ঙ) সাধারণ সমাধান (general solution) নির্ণয় করো : $\cos z = 2$.

Please Turn Over

(চ) যদি a, b, c ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা হয়, তবে প্রমাণ করো

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} > \frac{3}{2} \text{ যদি না } a = b = c \text{ হয়।}$$

(ছ) $x^7 - 1 = 0$ সমীকরণের বীজগুলির 99তম ঘাতের সমষ্টি নির্ণয় করো।

বিভাগ - খ

(মান : ২৫)

৩। যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

২½×২

(ক) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ম্যাপিং-টি এভাবে সংজ্ঞাত :

$$f(x) = x^2 - 5x + 6$$

প্রমাণ করো যে f injective বা surjective কোনোটিই নয়।

(খ) দুটি পূর্ণসংখ্যা u এবং v নির্ণয় করো যাতে $54u + 24v = 30$ হয়।

(গ) 3^{2024} সংখ্যাটির একক অঙ্কটি নির্ণয় করো।

(ঘ) নিম্নলিখিত সম্পর্কটি (relation) একটি সমতুল্য সম্পর্ক (equivalence relation) কি না যাচাই করো,

$$\text{যেখানে } a R b \text{ if and only if } a - b < 5, a, b \in \mathbb{Z}.$$

৪। যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) 315 এবং 4235 সংখ্যাছয়ের গ.সা.গু নির্ণয় করো এবং দুটি পূর্ণসংখ্যা s এবং t বের করো যাতে

$$\gcd(315, 4235) = 315s + 4235t \text{ হয়।}$$

৫

(খ) যদি $\lfloor 1 \rfloor + \lfloor 2 \rfloor + \lfloor 3 \rfloor + \dots + \lfloor 100 \rfloor$ -কে 40 দ্বারা ভাগ করা হয়, তবে ভাগশেষ নির্ণয় করো।

৫

(গ) $f \circ g$ এবং $g \circ f$ নির্ণয় করো, যেখানে $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ -কে $f(x) = |x| + x, x \in \mathbb{R}$ এবং $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ -কে

$$g(x) = |x| - x, x \in \mathbb{R} \text{ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।}$$

৫

(ঘ) Chinese remainder উপপাদ্য প্রয়োগ করে সমাধান করো :

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 4 \pmod{7}$$

(ঙ) (অ) $\phi(2024)$ -এর মান নির্ণয় করো।

৫

(আ) $n^2 + n + 41$ সর্বদা একটি মৌলিক সংখ্যা, যেখানে n একটি স্বাভাবিক সংখ্যা। — এটি কি ঠিক? যুক্তিসহ বিচার করো।

৩+২

(চ) যদি $A = \{2, 3, 4\}$ হয়, তবে A -র উপর সম্ভাব্য সকল relation-এর সংখ্যা নির্ণয় করো যারা reflexive এবং symmetric উভয়ই।

৫

(ছ) $A = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{2} \right\}$, $B = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$ এবং $f: A \rightarrow B$ ম্যাপিংটি এভাবে সংজ্ঞায়িত :

$$f(x) = \frac{x-3}{2x+1}, \forall x \in A.$$

f^{-1} -এর অস্তিত্ব আছে কি? যুক্তিসহ বিচার করো।

১+৪

বিভাগ - গ

(মান : ২৫)

৫। যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

২½×২

(ক) ভেক্টরের সেট $\{(1, 5, 2), (1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$, \mathbb{R}^3 -তে রৈখিকভাবে স্বাধীন (linearly independent) কি না তা যাচাই করো।

(খ) \mathbb{R}^3 -এর উপসেট S -এর একটি spanning সেট লেখো, যেখানে $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + y - z = 0\}$.

(গ) যদি A ম্যাট্রিক্সটি invertible এবং $AB = 0$ হয়, তাহলে দেখাও যে $B = 0$ যেখানে A এবং B উভয়েই $n \times n$ বর্গ ম্যাট্রিক্স।

(ঘ) λ -এর মান নির্ণয় করো যাতে ম্যাট্রিক্স $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}$ -এর নিজস্ব বিপরীত (own inverse) হয়।

৬। যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৫×৪

(ক) নীচের ম্যাট্রিক্সটির row reduced Echelon form তৈরি করে ম্যাট্রিক্সটির rank বার করো।

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

(খ) a এবং b -এর কোন্ মানের জন্য

$$x + y + z = 1$$

$$x + 2y - z = b$$

$$5x + 7y + az = b^2$$

এই system of linear equations-এর

(অ) একটিমাত্র সমাধান (unique solution) থাকবে?

(আ) কোনো সমাধান নেই (no solution)?

(ই) অসংখ্য সমাধান (many solutions) থাকবে?

(গ) প্রমাণ করো যে, $(A + B)A^{-1}(A - B) = (A - B)A^{-1}(A + B)$ যদি A এবং B বর্গ ম্যাট্রিক্স হয় এবং A বিপরীতমুখী (invertible) হয়।

Please Turn Over

(ঘ) যদি $\{\alpha, \beta, \gamma\}$, \mathbb{R}^n -এ রৈখিকভাবে স্বাধীন (linearly independent) সেট হয়, তবে প্রমাণ করো যে,

$$\{\alpha + \beta + \gamma, \beta + \gamma, \gamma\}$$

\mathbb{R}^n -এ একটি রৈখিকভাবে স্বাধীন (linearly independent) সেট।

(ঙ) $\left. \begin{array}{l} x - 2y + z = 0 \\ x - 2y - z = 0 \end{array} \right\}$ এই system of linear equations-এর সমাধান ক্ষেত্রের (Solution space) dimension এবং basis নির্ণয় করো।

(চ) $2x - 3y + 4z = 3$, $3x + 2y - z = 4$, $5x + 3y - z = 7$ সমীকরণগুলিকে ম্যাট্রিক্স আকার $AX = B$ -তে পরিণত করে সমাধান করো।

(ছ) যদি $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ একটি সেট, যেখানে $\alpha_1 = (1, 2, 1)$, $\alpha_2 = (-3, -6, 3)$, $\alpha_3 = (2, 1, 3)$, $\alpha_4 = (8, 7, 7) \in \mathbb{R}^3$ হয়, তবে S -এর একটি subset T নির্ণয় করো যাতে $L(S) = L(T)$ হয়। এখানে $L(S)$ S -র linear span নির্দেশ করছে।

[English Version]

The figures in the margin indicate full marks.

Throughout the question paper \mathbb{R} denotes the set of real numbers.

Other symbols have their usual meanings.

Group - A

(Marks : 25)

1. Answer *any two* questions : 2½×2
 - (a) Find the cube roots of -1 .
 - (b) Apply Descartes' rule of signs to find the nature of the roots of the equation $x^8 - 1 = 0$.
 - (c) Show that $(n + 1)^n > 2^n \cdot n!$, where n is any positive integer.
 - (d) If the roots of the equation $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ are in A.P., then show that $p^2 \geq 3q$.
2. Answer *any four* questions : 5×4
 - (a) Prove that $\sin \left[i \log \frac{a - ib}{a + ib} \right] = \frac{2ab}{a^2 + b^2}$, where a, b are real numbers not both zero.
 - (b) Solve the equation $x^3 - 18x - 35 = 0$, by Cardan's method.
 - (c) Solve the equation $2x^3 - x^2 - 18x + 9 = 0$ if two of the roots are equal in magnitude but opposite in sign.

- (d) Using Cauchy-Schwartz inequality, prove that

$$(a+b+c+d) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \right) > 16,$$

where a, b, c, d are all positive real numbers (not all equal).

- (e) Solve the equation $\cos z = 2$, where the solutions should be written in general form.

- (f) a, b, c be positive real numbers, prove that

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} > \frac{3}{2}, \text{ unless } a = b = c.$$

- (g) Find the sum of 99th powers of the roots of the equation $x^7 - 1 = 0$.

Group - B

(Marks : 25)

3. Answer **any two** questions :

2½×2

- (a) Suppose $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x^2 - 5x + 6$. Prove that f is neither an injective mapping nor a surjective mapping.
- (b) Find two integers u and v such that $54u + 24v = 30$.
- (c) Find out the unit digit of 3^{2024} .
- (d) Examine whether the relation R , defined on the set \mathbb{Z} by $a R b$ if and only if $a - b < 5, a, b \in \mathbb{Z}$ is an equivalence relation or not.

4. Answer **any four** questions :

- (a) Find gcd of 315 and 4235 and find integers s and t such that $\text{gcd}(315, 4235) = 315s + 4235t$.
5
- (b) Find the remainder when $|1| + |2| + |3| + \dots + |100|$ is divided by 40.
5
- (c) Find $f \circ g$ and $g \circ f$, where $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by $f(x) = |x| + x, x \in \mathbb{R}$ and $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by $g(x) = |x| - x, x \in \mathbb{R}$.
5
- (d) Solve the system of linear congruences by Chinese remainder theorem

$$\begin{aligned} x &\equiv 2 \pmod{3} \\ x &\equiv 3 \pmod{5} \\ x &\equiv 4 \pmod{7} \end{aligned}$$

5
- (e) (i) Find the value of $\phi(2024)$.
 (ii) $n^2 + n + 41$ is a prime number, for all $n \in \mathbb{N}$. Is it true? Justify your answer. 3+2
- (f) If $A = \{2, 3, 4\}$, then find the number of relations on A which are both reflexive and symmetric.
5

Please Turn Over

(g) Let $A = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{2} \right\}$, $B = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$, where \mathbb{R} denotes the set of all real. Let $f: A \rightarrow B$ be defined by

$$f(x) = \frac{x-3}{2x+1}, \text{ for all } x \in A. \text{ Does } f^{-1} \text{ exist? Justify your answer.} \quad 1+4$$

Group - C

(Marks : 25)

5. Answer **any two** questions :

2½×2

- (a) Verify whether the set of vectors $\{(1, 5, 2), (1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ is linearly independent or not in \mathbb{R}^3 .
- (b) Find a spanning set of the subset S of \mathbb{R}^3 , where $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + y - z = 0\}$.
- (c) If A is invertible and $AB = 0$, then prove that $B = 0$, where A, B both $n \times n$ (square) matrices.
- (d) Find the value of λ so that the matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}$ is its own inverse.

6. Answer **any four** questions :

5×4

- (a) Find the rank of the matrix by reducing it to row reduced Echelon form

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (b) Determine the conditions for which the system $x + y + z = 1$, $x + 2y - z = b$, $5x + 7y + az = b^2$ admits of (i) only one solution, (ii) no solution, (iii) many solutions.
- (c) Prove that $(A + B)A^{-1}(A - B) = (A - B)A^{-1}(A + B)$ if A and B are square matrices and A is invertible.
- (d) If $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ is linearly independent set of vectors in space \mathbb{R}^n , then prove that $\{\alpha + \beta + \gamma, \beta + \gamma, \gamma\}$ is also a linearly independent set in \mathbb{R}^n .
- (e) Find the dimension and basis of the solution space of the system of equations :

$$x - 2y + z = 0$$

$$x - 2y - z = 0$$

- (f) Transfer the system of equation $2x - 3y + 4z = 3$, $3x + 2y - z = 4$, $5x + 3y - z = 7$ to a matrix equation $AX = B$. Hence, solve the system by using the properties of matrix.
- (g) Find a linearly independent subset T of the set $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$, where $\alpha_1 = (1, 2, 1)$, $\alpha_2 = (-3, -6, 3)$, $\alpha_3 = (2, 1, 3)$, $\alpha_4 = (8, 7, 7) \in \mathbb{R}^3$ which spans the same space as S .